

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE : 24 numéros par an

ÉDITION DE LA STATION DE RHONE-ALPES (Tél. Franklin 20-56)

(AIN, ARDÈCHE, DROME, HAUTE-SAVOIE, ISERE, LOIRE, RHONE, SAVOIE)

Régisseur de recettes de la Protection des Végétaux. 4, place Gensoul - LYON.

C. C. P. : LYON 9.430-12

ABONNEMENT ANNUEL

12 NF

Supplément au bulletin N° 1 d'Octobre 1960

ARBRES FRUITIERS A NOYAUX

CORYNEUM DU PECHER ET DU CERISIER: Cette maladie est la cause de la "criblure" du feuillage. Elle apparait sous forme de petites taches d'abord rouges puis desséchées, de 1 à 2mm de diamètre seulement, cerclées du même rouge-vineux. Les tissus desséchés au niveau des taches tombent assez rapidement pour donner la criblure caractéristique. Sur fruit, on trouve de petites taches semblables brun clair, coriaces, cerclées de rouge, groupées en général sur une seule face du fruit.

Les rameaux peuvent être atteints à leur tour de taches rouges violacées, ovales, souvent plus grandes que sur les feuilles, taches qui prennent en leur centre une teinte brun sombre et pouvant l'année suivante être le siège d'émissions de gomme.

Les attaques les plus graves se portent sur les yeux qui se dessèchent et produisent en général une gomme plus ou moins abondante. Ces dernières atteintes peuvent se produire pendant toute la durée d'hivers doux et pluvieux comme nous en connaissons depuis quelques années, d'autant plus que les rameaux et les yeux sont alors les seules parties que les germes de la maladie puissent atteindre.

On comprend dès lors l'importance des traitements d'automne.

Jusqu'à ces dernières années l'obstacle principal à ces traitements résidait dans la sensibilité du pêcher au cuivre, principalement lorsque l'aoulement des bois a été contrarié par un été frais et pluvieux comme celui que nous venons de traverser. Les nouveaux fongicides de synthèse permettent d'obvier cet inconvénient.

En résumé:

- Si l'on désire utiliser sur pêcher les produits cupriques, (bouillie bordelaise à 2% ou dose équivalente d'oxychlorure, de sulfate basique ou d'oxyde cuivreux), ne traiter que lorsqu'on peut constater un bon aoulement du bois.
- A l'aide des fongicides de synthèse (captane, Zirame, Thirame, Zinèbe, Ferbame) ou des soufres micronisés (par temps chaud et ensoleillé seulement) ou des produits cupriques sur cerisier, il est possible de traiter dès la chute des feuilles.

Enfin, signalons que ce traitement a également une efficacité certaine contre la cloque du pêcher, notamment lorsqu'on utilise un produit cuprique ou à base du complexe zirame-cuivre ou de thirame.

De toutes façons, ces traitements ne dispensent aucunement des traitements de prédébouillage.

P. 287

ARBRES FRUITIERS A PEPINS

CHANCRE DU POMMIER: Assez peu répandue dans notre région, cette maladie risque cependant de connaître une certaine extension à la suite de la longue période pluvieuse que nous subissons depuis 4 mois.

Le traitement, à base de produits cupriques (500gr/hl de cuivre métal) doit se placer à la chute des dernières feuilles.

ENQUETE SUR LA CAMPAGNE 1960 DE TRAITEMENTS

Un certain nombre de formules d'enquête nous sont déjà parvenues. Les observations qu'elles contiennent sont précieuses pour le fonctionnement et la qualité des Avertissements Agricoles.

Nous invitons nos abonnés qui ne l'auraient pas fait à remplir le plus complètement qu'il leur sera possible cette formule qu'ils ont reçue en début de campagne et à nous la retourner prochainement.

En cas de perte, nous en possédons encore quelques exemplaires à leur disposition.

Le Contrôleur chargé des
Avertissements Agricoles
P.LATARD

L'Inspecteur de la
Protection des Végétaux
A.PITHLOUD